




GIG
CYMRU
NHS
WALES

Peidiwch ag
oedi. Ni fydd
defnyddio'r
pigiad hwn yn
achosi niwed.



**Cit Pigiad Mewngyhyrol
Hydrocortison Brys Plentyn**

1 Cynnwys:

Bag plastig i'w ddefnyddio fel arwyneb glân;
2 x Hydrocortison 100g/mL ampwl;
2 x Chwistrell; 2 x Nodwydd las;
Cerdyn Therapi Amnewid Pediatrig;
Y daflen gyfarwyddiadau hon.



Sganiwch y cod QR i
weld recordiad sain a
fideo o'r daflen

2

Tapiwch ben yr ampwl fel bod yr holl hylif ar y gwaelod.



Gan ddal yr ampwl yn un llaw, gosodwch bawd y llaw arall ar y smotyn sydd ar y gwddf.

Snapiwch gwddf yr ampwl.

3

Cysylltwch y nodwydd i'r chwistrell a thynnu'r cap.



Gosodwch nodwydd y chwistrell o fewn yr ampwl gyda'r blaen yn cyffwrdd â'r gwaelod.

4



Tynnwch plymiwr
y chwistrell tuag
atoch i gasglu
cyfaint sydd angen:



Plentyn yn
iau nag 1
mlwydd oed
= 0.25mL
(25mg)

1-5
mlwydd oed
= 0.5mL
(50mg)

Hyn 5
mlwydd oed
= 1mL
(100mg)



5

Daliwch y chwistrell gyda'r nodwydd i fyn a thapiwch i adael i swigod aer codi.

Gwasgwch y plymiw waredu'r aer.



6

Dewch o hyd i safle'r pigiad yng nghanol gyhyr ucha'r goes.



7


Daliwch y chwistrell ar ongl o 90° i safle'r pigiad.

Gosodwch nodwydd y chwistrell i mewn i'r safle a gwthiwch y plymiwr tan fod yn wag.



8

Tynnwch y nodwydd a'r chwistrell, gorchuddiwch y nodwydd gyda'r gorchudd pinc a gosodwch ym mhlwch y cit.



9

Ffoniwch 999 gan ddweud argyfwng adrenal.

Dangoswch y cerdyn therapi amnewid pediatrig yn syth i griw'r ambiwlans.



10

Gwardwch blwch y cit yn y bin miniog yr ambiwlans, ysbyty neu'r fferyllfa.



Manylion cyswllt: